

## **Rainfall -Alerts and Warning : Dt.06.09.2025**

**As per IMD**

**Impact based forecast (IBF) for Agriculture for the districts of Saurashtra-Kachchh  
(based on the forecast issued on 06-09-2025)**

**District Level Forecast and warning issued by MC, Ahmedabad on 06-09-2025**

**Heavy to very heavy rainfall Alerts and Warning Issued: Dt.06.09.2025**

**As per IMD**

**Dated 07 to 08-September-2025: Heavy to very heavy Rain fall warning as per following**

|  |
|--|
| District wise Warning issued by IMD, MC Ahmedabad  |
| Dt.:07.09.2025<br>Heavy to very heavy rains at a few places with isolated extremely heavy falls very likely in the districts of Saurashtra- Kutch namely Surendranagar and Rajkot.   |
| Dt.:07.09.2025<br>Heavy to very heavy rains very likely at a few places in the districts of Saurashtra- Kutch namely Morbi, Dwarka   |
| Dt.:07.09.2025<br>Heavy rains very likely at a few places in the districts of Saurashtra- Kutch namely Amreli  |
| Dt.:08.09.2025<br>Heavy to very heavy rains very likely at a few places in the districts of Saurashtra- Kutch namely Surendranagar, Rajkot and Morbi.  |
| Dt.:08.09.2025<br>Heavy rains very likely at a few places in the districts of Saurashtra- Kutch namely Jamnagar, and Dwarka  |
| <b>Expected Impact with respect to Orange and Yellow Colour warning issued for the Districts namely Amreli, Jamnagar, Dwarka, Rajkot, Surendranagar and Morbi.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Soil erosion and lodging of trees and plant.</li><li>• Major damage to kuchcha roads due to inundation.</li><li>• Major disruption in traffic in city areas.</li><li>• Inundation of low lying areas leading to damage to kuchcha houses.</li><li>• Water logging in underpass in city areas.</li><li>• Sudden reduction in visibility during heavy downpour leading to road accidents.</li><li>• Mainly water logging problem found near wetland and marshy land of urban land rural region.</li><li>• Falling of trees/branches and advertising hoardings in gusty winds.</li><li>• Damage to horticulture crop, plantation and Kharif crops like cotton, maize, pearl millet, black gram, banana, sapota, mango etc.</li><li>• Extensive clogging of drains due to debris flows in drainage areas.</li><li>• Severe disruption to solar energy output.</li><li>• Severe impact on agriculture</li><li>• Loss of livestock and significant loss of crops due to flooding and soil erosion</li><li>• Impact on economy and livelihoods</li><li>• Life threatening, extensive flash flooding of vulnerable areas.</li></ul> |

- Fisheries activities may be hampered severely

**Steps to be taken to minimize damage:**

**For Agriculture**

- Arrange for extensive drainage facilities to remove excess water from standing crop fields.
- Provide mechanical support to horticultural crops and staking to vegetable crops.
- Do not carry out any kind of foliar spray in crop field during forecast period.
- After cessation of wet spell immediately apply Ammonium sulphate and murate of potash fertilizers 30 kg/ha each under vapsa condition.
- Keep animals indoor during the period.
- Do not let the animal outside during heavy rains.
- Make provision of quality fodder and drinking water for animals.
- Take care that no rain water should enter into poultry house.

**IBF & Agromet Advisories based on the forecast issued by**

**AMFU-Targadia on 06-09-2025**

| District  | Crop   | Stage                                     | Likely Impact on crop  | Advisory   |
|---|--------|---|--|--|
| Amreli<br>Dwarka,<br>Jamnagar,<br>surendranagar,<br>Morbi<br>and<br>Rajkot<br>districts | Cotton | Squaring and flowering and boll formation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infestation of fungal diseases may occur.</li> <li>• Yellowing due to wet spell.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrange for extensive drainage facility during spells of heavy rainfall.</li> <li>• After cessation of wet spell immediately apply Ammonium sulphate and murate of potash fertilizers 30 kg/ha each under vapsa condition.</li> <li>• Keep the field in vapsa condition.</li> <li>• <b>To prevent alternaria blight disease infestation spray Mencozeb 75 % WP 27 gm in 10 liters of water as precautionary measure under clear sky.</b></li> </ul> |
|   | Ground | Pegging and pod formation-development     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infestation of fungal diseases may occur.</li> <li>• Yellowing of crops due to long period soil moisture saturation condition.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrange for extensive drainage facility during spells of heavy rainfall.</li> <li>• Keep the field in vapsa condition.</li> <li>• <b>To prevent leaf spot disease infestation spray</b></li> </ul>  |

|  |                     |                             |  |   |
|--|---------------------|-----------------------------|--|---|
|  |                     |                             |  | Tebuconazole 18.3 % SC<br>10 in 10 liters of water as<br>precautionary measure<br>under clear sky.  |
|  | Sesame              | Flowering &<br>capsule      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infestation of fungal diseases like leaf spot, Phytophthora blight and powdery mildew may occurs.</li> <li>• Lodging may occurs.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To prevent leaf spot disease infestation spray Ridomil SL 20 gm in 10 liters of water as precautionary measure under clear sky.</li> </ul>   |
|  | All vegetable crops | Fruiting and fruit ripening | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inferior the quality of fruits</li> <li>• Fungal disease infestation may increase.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrange for extensive drainage facility during spells of heavy rainfall.</li> <li>• After cessation of wet spell immediately apply Ammouium sulphate and murate of post fertilizers 30 kg/ha each unde vapsa condition.</li> <li>• Keep the field in vapsa condition.</li> <li>• To prevent downy mildew disease infestation spray Mencozeb 75 % WP 27 gm in 10 liters of water as precautionary measure under clear sky.</li> </ul> |

### Regional language

ભારે થી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી : તા.૦૬.૦૮.૨૦૨૫

|           |   |
|-----------|---|
| તારીખ     | ભારત સરકાર શ્રીના હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્ર દ્વારા પ્રસારિત આગાહી અનુસાર   |
| ૦૭-૦૮     | તા.૦૭.૦૮.૨૦૨૫ : સૌરાષ્ટ્રના સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ ભાવનગર, અમરેલી અને બોટાદ, જિલ્લાઓમાં અમુક સ્થળોએ ભારે થી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. |
| સપ્ટેમ્બર | તા.૦૭.૦૮.૨૦૨૫ : સૌરાષ્ટ્રના મોરબી, અને દ્વારકા જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે થી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.                           |
| ૨૦૨૫      | તા.૦૭.૦૮.૨૦૨૫ : સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.  |
|           | તા.૦૮.૦૮.૨૦૨૫ : સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી, જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે થી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.              |
|           | તા.૦૮.૦૮.૨૦૨૫ : સૌરાષ્ટ્રના જામનગર અને દ્વારકા જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.  |
|           | ભારે વરસાદને કારણે  |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• નદી નાળાઓમાં ભારે પુર આવવાની શક્યતા રહે.</li> </ul>  |

- નદી કાંઠાની જમીનનું ધોવાણ થવાની શક્યતા રહે.
- નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણીનો ભરવો થાય.
- શહેરોમાં અન્ડર બ્રિજમાં પાણી ભરાય જવાની શક્યતા રહે.
- કાચા મકાનો પડવાની શક્યતા રહે.
- વૃક્ષો તૂટી પડવાની શક્યતા રહે.
- ખેતીવાડી પાકોને નુકશાન થાય.

#### ઉપરોક્ત વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને

- ખેતરના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ભરાયેલ પાણીનો તત્કાલ નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા કરવી.
- પાણીનો ભરાવો થતો હોય તેવા વિસ્તારમાં જવાનું ટાળો.
- તૈયાર ખેતપેદાશ અને પશુઓને સલામત જગ્યાએ રાખવા.
- આ સમય દરમિયાન ઉભાપાકમાં કોઈપણ પ્રકારની દવાઓ તેમજ ખાતરોનો છંટકાવ કરવો નહિ.
- બાગાયતી ફળઝાડ અને શાકભાજી પાકોને નુકશાન ઓછું થાય તે માટે ટેકા આપવા.
- આ સમય દરમિયાન ખેત પેદાશ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચાણ માટે લઈ જવી નહિ.
- મરઘા ઘરમાં વરસાદનું પાણી પડે નહિ તેની તકેદારી રાખવી.
- માછીમાર ભાઈઓએ દરિયામાં જવું નહિ.
- પ્રભાવિત વિસ્તારમાં નાગરીકોએ ઘરની બહાર નીકળવું નહિ.
- નીચાણવાળા વિસ્તારમાં અને કાચા મકાનમાંથી લોકોએ સલામત સ્થળે ખસી જવું.
- નદીના પટમાં જવું નહિ.
- પશુઓને ખીલ્લે બાંધવા નહિ તેમજ નદી કે તળાવના પટમાં રાખવા નહિ.

#### હવામાન આગાહી આધારિત કૃષિ સલાહ :

| જિલ્લો   | પાક  | પાક અવસ્થા             | પાક ઉપર સંભવિત  | કૃષિસલાહ  |
|--|------|------------------------|---|---|
| સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી રાજકોટ, જામનગર, સુરેન્દ્રનગર અને દ્વારકા જિલ્લાઓમાં | કપાસ | ચાપવા, ફૂલ અને ઝીન્ડવા | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ફૂગ જન્ય રોગનો ઉપદ્રવ થવાની સંભાવના</li> <li>• લાંબો સમય પાણી ભરાય રહેવાના કારણે છોડ સુકાય શકે.</li> <li>• ધીમો વિકાસ થાય</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• વરસાદના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવી.</li> <li>• વરસાદનો રાઉન્ડ પૂરો થયા પછી કપાસમાં એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક 30 કી.ગ્રા./હે. પુરતી ખાતર તરીકે આપવું.</li> <li>• અલ્ટરનેરઆ ફૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે મેન્કોઝેબ</li> </ul> |

|                                 |              |                      |   |   |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---|---|
| રેડ,ઓરેન્જ<br>અને યેલો<br>એલર્ટ |              |                      |   | ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર<br>પાણીમાં મિશ્ર કરી<br>છંટકાવ કરવો.   |
|                                 | મગફળી        | સુયા અને પોપટા       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ઉભા પાકમાં ફૂગ જન્ય રોગના ઉપદ્રવની સંભાવના</li> <li>સતત પાણી ભરવાના કારણે મગફળી પીળી પડવાની શક્યતા રહે.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>વરસાદના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવી.</li> <li>સરકોસ્પોરા ફૂગનો પાનના ટપકાનો રોગ લાગે નહિ તે માટે ટેબ્યુંકોનાઝોલ ૧૮.૩ ૧૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>  |
|                                 | તલ           | ફૂલ અને બૈઈઢાં બેસવા | <ul style="list-style-type: none"> <li>ઉભા પાકમાં ફૂગ જન્ય રોગના ઉપદ્રવની સંભાવના</li> <li>ભારે પવન અને વરસાદથી ઢાળી જવાની શક્યતા</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ફૂગનો પાનના ટપકાનો, કાળીયો અને ભૂકી છારાના રોગ લાગે નહિ તે માટે રીડોમિલ ૨૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>   |
|                                 | શાકભાજી પાકો | ફૂલ અને ફળ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ઉભા પાકમાં ફૂગ જન્ય રોગના ઉપદ્રવની સંભાવના</li> <li>સતત પાણી ભરાવાના કારણે છોડ પીળો પડી સુકાવા લાગે.</li> <li>વૃદ્ધિ અને વિકાસ રૂંધાય</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>વરસાદના પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવી.</li> <li>વરસાદનો રાઉન્ડ પૂરો થયા પછી એમોનિયમ સલ્ફેટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ દરેક ૩૦ કી.ગ્રા./હે. આપવું.</li> <li>તળછારાની ફૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul> |