



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતઆબોહવાકીય વિભાગ
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડિયા-૩૬૦૦૨૩
તા.૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૫



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જુ.ક.યુ.તરઘડિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૪૭/૨૦૨૫

પાછલા અઠવાડિયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	
વરસાદ(મી.મી)	102.4
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	26.2-30.3
લઘુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	20.523.4
ભેજ (%)સવાર	88-96
ભેજ (%)બપોરબાદ	75-98
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)	3.2-6.9

હવામાન આગાહી :પત્રક-ક

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૧૪-૦૯-૨૦૨૫ સવારના ૮.૩૦ સુધી

તા.૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી ૧૪-૦૯-૨૦૨૫

કૃષિસલાહ :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડિયા તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૦-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૧૧-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૩-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૫
વરસાદ(મી.મી.)	5	4	3	2	1
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	32	32	33	33	33
લઘુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	24	24	24	25	26
મહત્તમભેજ (%)સવાર	90	90	90	90	90
લઘુતમભેજ (%) બપોરબાદ	75	70	70	70	70
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	11	9	9	7	7
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	195	204	223	231	251

વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	3	3	5	5	6
હવામાન આગાહી સારાંશ : - રાજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૫ દરમ્યાન ભેજવાળું અને આંશિક થી મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તેમજ તા. ૧૦ થી ૧૪- સપ્ટેમ્બર ના રોજ છૂટાછવાયા હળવા વરસાદી ઝાપટા થવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૯૦-૯૦ અને ૭૦-૭૫ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા દક્ષિણ, નૈરુત્ય અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૭ થી ૧૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે					

મોરબી:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૦-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૧૧-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૩-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૫
વરસાદ(મી.મી.)	4	2	1	1	1
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	32	32	33	33	33
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	24	24	24	25	26
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	90	90	90	90	90
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	75	70	70	70	70
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	15	12	13	12	10
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	197	207	224	226	245
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	3	3	3	4	5
હવામાન આગાહી સારાંશ : - મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૫ દરમ્યાન ભેજવાળું અને આંશિક થી મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તા. ૧૦ થી ૧૪- સપ્ટેમ્બર ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા થવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૯૦-૯૦ અને ૭૦-૭૫ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા દક્ષિણ અને નૈરુત્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૦ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે					

દેવભૂમિદ્વારકા :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૦-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૧૧-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૩-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૫
વરસાદ(મી.મી.)	4	3	1	1	1
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	30	31	32	32	31

લઘુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	26	27	27	28	28
મહતમ ભેજ (%)સવાર	90	90	90	90	90
લઘુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	85	70	70	75	70
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	15	12	13	11	7
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	207	212	229	238	247
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	5	3	4	5	5
હવામાન આગાહી સારાંશ : - દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૫ દરમિયાન ભેજવાળું અને આંશિક થી મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તેમજ તા. ૧૦ થી ૧૪-સપ્ટેમ્બર ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા થવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૩૦-૩૨ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૨૬-૨૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૯૦-૯૦ અને ૭૦-૮૫ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા નૈરુત્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૭ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે					

સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૦-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૧૧-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૩-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૫
વરસાદ (મી.મી.)	4	3	2	1	1
મહતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	32	32	33	33	33
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	24	24	24	25	26
મહતમ ભેજ (%)સવાર	90	90	90	90	90
લઘુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	75	70	70	70	70
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	12	10	12	11	10
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	194	225	247	255	272
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	2	3	5	5	6

હવામાન આગાહી સારાંશ :

- સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૫ દરમિયાન ભેજવાળું અને આંશિક થી મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તેમજ તા. ૧૦ થી ૧૪- સપ્ટેમ્બર ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૩૨-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૨૪-૨૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૯૦-૯૦ અને ૭૦-૭૫ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા દક્ષિણ, નૈરુત્ય અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૦ થી ૧૨ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે

અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૦-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૧૧-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૩-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૫
વરસાદ (મી.મી.)	5	4	3	2	1
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	33	32	33	33	33
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	23	22	23	23	23
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	90	90	85	90	90
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	70	70	70	70	70
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	9	7	8	8	8
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	208	223	247	259	281
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	2	3	5	6	6

હવામાન આગાહી સારાંશ :

- અમરેલી જિલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૫ દરમિયાન ભેજવાળું અને આંશિક થી મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તેમજ તા. ૧૦ થી ૧૪- સપ્ટેમ્બર ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૩૨-૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૨૨-૨૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૫-૯૦ અને ૭૦-૭૦ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા નૈરુત્ય અને પશ્ચિમની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૭ થી ૯ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે

જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૧૦-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૧૧-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૪ ૧૩-૦૯-૨૦૨૫	દિવસ-૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૫
વરસાદ (મી.મી.)	4	2	1	1	1
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	31	31	30	31	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	26	27	28	29	29
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	90	85	80	80	80
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	80	75	70	70	70
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	15	12	11	11	8
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	199	200	220	221	234
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	4	3	4	5	5

હવામાન આગાહી સારાંશ :

- જામનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૧૦-૦૯-૨૦૨૫ થી તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૫ દરમ્યાન ભેજવાળું અને આંશિક થી મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે તેમજ તા. ૧૦ થી ૧૪-સપ્ટેમ્બર ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા થવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૦-૩૧ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૯ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૦-૯૦ અને ૭૦-૮૦ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા દક્ષિણ અને નૈરુત્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૮ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે

હવામાન ચેતવણી : નથી

હવામાન ચેતવણીની કૃષિ પર સંભવિત અસર અને તે અનુસંધાને કૃષિ સલાહ : નથી

સામાન્ય કૃષિ સલાહ :

- વરાપે કપાસમાં પાળા ચડાવવા.
- વરાપે કપાસ, મગફળી અને સોયાબીન પાકમાં નિદામણ કરવું.
- તમામ પાકોમાં ફૂગના રોગના ઉપદ્રવને અટકાવવા માટે પ્રોપીકોનાઝોલ @ 10 મિલી/10 લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
- કપાસ અને શાકભાજી પાકોમાં ભલામણ મુજબ નાઈટ્રોજન યુક્ત ખાતરનો પુરતી ડોઝ આપવો.

હવામાન આગોતરો વરતારો : તા. ૧૪ થી ૧૯-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૫ દરમ્યાન ભેજવાળું અને વાદળછાયું હવામાન અને હળવો વરસાદ રહેવાની સંભાવના છે.

મોબાઈલ સંદેશ : મગફળીમાં સરકોસ્પોરા ફૂગનો પાનના ટપકાનો રોગ અને ગેરુ લાગે નહિ તે માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૧૫મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો.

મુખ્યપાક	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)
ચીમાસું મગફળી	સુયા બેસવા અને ડોડવા બંધાવવા	પાનના ટપકા 	- સરકોસ્પોરા ફૂગનો પાનના ટપકાનો રોગ અને ગેરુ લાગે નહિ તે માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૧૫મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો. - મગફળીમાં નિદામણ કરવું. - મગફળીમાં સફેદ ફૂગનો ઉપદ્રવ અટકાવવા ટ્રાયકોડર્મા ફૂગ ૨.૫

			કી.ગ્રા./હે. મુજબ ગળતીયા દેશી ખાતર અથવા દિવેલાના ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. મિશ્ર કરીને જમીનમાં આપવું.
કપાસ	ચાપવા અને ફૂલ	શ્રીપ્સ અને તડતડીયા/લીલી પોપટી ગુલાબી ઇયળ	- કપાસમાં શ્રીપ્સ અને તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે એસીફેટ ૭૫ ટકા પાવડર ૧૫ ગ્રામ + ફીપ્રોનીલ ૫ % એસ.સી. ૧૫ મી.લી. અને ૧૫૦૦ પીપીએમ લીમડાનું તેલ ૪૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરપે છંટકાવ કરવો. - અલ્ટરનેરીઆ ફૂગનો રોગ લાગે નહિ તે માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીઅતા પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો. ➤ કપાસમાં ગુલાબી ઇયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ છે. ગુલાબી ઇયળના ઉપદ્રવના મોનીટરીંગ માટે હેક્ટરે ૫ થી ૬ ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવા. કપાસમાં ગુલાબી ઇયળથી નુકશાન પામેલ ફૂલ અને ચાપવા તોડીને જમીનમાં દાટી દેવા. વધુ નુકશાન હોય તો પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઇ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦ મિલી સાથે બીવેરીયા બાસીઆના ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ➤ બી.ટી. કપાસમાં ફૂલ ભમરી, ઝીન્ડવા બનવા અને ઝીન્ડવાના વિકાસની અવસ્થાએ ૨ ટકા પોટેશિયમ નાયટ્રેટના દ્રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦૦ ગ્રામ) છંટકાવ કરવો. ➤ બી.ટી. કપાસમાં વાવેતર બાદ ૬૦, ૭૫ અને ૯૦ દિવસે ૧ ટકા મલ્ટી માયકોન્યુટ્રીયન્ટના દ્રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૧૦૦ ગ્રામ) છંટકાવ કરવો. ➤ કપાસમાં વરાપે પાળા ચડાવવા અને નિંદામણ કરવું.
તલ	ફૂલ અને બૈઇઢા	કાળીયો પાન વાળનાર ઇયળ	- તલમાં વરાપે નિંદામણ કરવું. - તલમાં ફૂગજન્ય રોગ જેવા કે કાળીયો, પાનના ટપકા અને રાખોડી નો ઉપદ્રવ ના થાય તે માટે રીડોમિલ દવા ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. તલમાં પાન વાળનાર ઇયળનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો કારટેપ હાયડ્રોક્લોરાઈડ ૧૫ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો. અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૩ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૩૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

		પાન કથીરી	ગરમ ભેજવાળા હવામાનના કારણે તલમાં જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો પ્રોપરગાઈટ ૨૫ મિલી પ્રતિ પંપ હવામાન ચોખ્ખું હોય ત્યારે વરાપે છંટકાવ કરવો.
બાજરી	નીધલ	--	
મગ	શીંગ	-	પાકી ગયેલ શીંગો સમયસર વીણી લેવી .
અડદ	ફૂલ અને શીંગ	-	સમયસર નિંદામણ કરવું.
ચોળી	ફૂલ/શીંગ	મોલો	પાકી ગયેલ શીંગો સમયસર વીણી લેવી .
તુવેર	ઉગાવો/વૃદ્ધિ	-	સમયસર નિંદામણ કરવું.
દિવેલા	ઉગાવો /વૃદ્ધિ	લશ્કરી ઈયળ	- દિવેલામાં લશ્કરી અને ઘોડિયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છાંટવી. - સમયસર નિંદામણ કરવું.
ભીંડા	ફૂલ/ફળ	સફેદમાખી, પાનકથીરી	- સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને હવામાન ચોખ્ખું હોય ત્યારે વરાપે છંટકાવ કરવો. - ગરમ ભેજવાળા હવામાનના કારણે ભીંડામાં જો પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ મિલી પ્રતિ પંપ હવામાન ચોખ્ખું હોય ત્યારે વરાપે છંટકાવ કરવો. - ભીંડાની વીણી બાદ ૫૦ કી.ગ્રા./હા યુરિઆ ખાતર વરાપે આપવું.
તુરીયા	વૃદ્ધિ વિકાસ/ફૂલ ફળ	સફેદમાખી તળછારો	- વધારાના વરસાદી પાણીના નિકાલની કાળજી રાખવી. - વેલાવાળા શાકભાજીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મિલી અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટરપાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. - વેલાવાળા શાકભાજીમાં તળછારાના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ પંપમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો.
દૂધી			
ગલકા			
કારેલા			
ગુવાર			
કાકડી			
રીંગણી	ફૂલ/ફળ	સફેદમાખી	રીંગણીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ

		ડુંખઅને→ ફળકોરીખાનારઈ યળ	૫૦૦ મીલી અને બાઈફેનથ્રીન ૧૦ ટકા ૧૦ મિલી અથવા ડાયફેનથાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ મિ.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. ➤ ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.
મરચી	વૃદ્ધિ/ફુલ/ફળ	થ્રીપ્સ,સફેદમાખી  પાન કથીરી	➤ પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. થ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૫ મિલી. પ્રતિ પંપ વરાપે છાંટવી. ➤ મરચીમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા ઈસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. વાયરસના કારણે કોક્કાચેલ મરચીના છોડ ઉપાડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ઉભા પાકમાં ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.
લીંબુ	ફળનો વિકાસ	પાનકોરીયુ કથીરી→  બળીઆ ટપકા અને ગુંદરિયો	- પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છાંટવી. - લીંબુડીમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો. - લીંબુમાં બળીઆ ટપકા અને ગુંદરિયો રોગના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્સી ક્લોરાઈડ ૪૦ ગ્રામ અને સ્ટ્રેપ્ટોમાયસીન સલ્ફેટ ૧ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.

પશુ/મરઘા 	ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મિ.લિ. એક લિટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા, ટી.બી. તથા જે.ડી ના રોગની પરખ કરાવવી. વરસાદના સમયે પશુઓને સુરક્ષીત જગ્યાએ રાખવા. ચોમાસા દરમિયાન જાનવરોને રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફિનાઈલ છાંટવું. દુધાળા પ્રાણીઓને નિયમિત ૧ કિલ્લો ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્વોનું મિશ્રણ પ્રતિ ૨ લીટર દુધની ઉપજના પ્રમાણમાં આપવું. તેમજ લીલું ઘાસ + સૂકું ઘાસ + ખનીજ તત્વો ખોરાકમાં આપવા. દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરિક પાવડરથી સાફ કરવું. ખુલ્લામાં રાખેલ ઘાસસારો વરસાદથી બગડે નહિ તે માટે જરૂરી પગલા ભરવા.
નોંધ	નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો • મૌસમ એપ જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે. • મેઘદ્રૂત એપ હવામાન આધારિત કૃષિસલાહ બુલેટીન માટે. • દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે.

જા.નં.જુકયુ/સૂ.ખે./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/ / ૨૦૨૫,
તરઘડિયા(રાજકોટ), તારીખ: ૦૮/૦૮/૨૦૨૫.

તંત્રીશ્રી/ડાયરેક્ટરશ્રી,
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં ,રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ધ કરાવવા નમ્ર વિનંતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.
ટેકનીકલ ઓફિસર

સુકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
તરઘડીયા



Gramin Krushi Mausam Seva
Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023



Agromet Advisory Service bulletin No.47 for North Saurashtra districts (Gujarat)

(Issued jointly by AMFU-DERS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period for 10 to 14-September-2025)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	102.4
Maximum temperature (°C)	26.2-30.3
Minimum temperature (°C)	20.523.4
Relative Humidity (%) I	88-96
Relative Humidity (%) II	75-98
Wind speed (Kmph)	3.2-6.9

Weather forecast until 08-30 hrs. of 14/09/2025

(1) RAJKOT DISTRICT:

	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	13/09/2025	14/09/2025
Rainfall (mm)	5	4	3	2	1
Max.Temp.(°C)	32	32	33	33	33
Min.Temp.(°C)	24	24	24	25	26
RH-I (%)	90	90	90	90	90
RH-II (%)	75	70	70	70	70
Wind Speed (kmph)	11	9	9	7	7
Wind Direction(deg.)	195	204	223	231	251
Total CC (octa)	3	3	5	5	6

Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department

- **General weather:** Humid and partly cloudy to generally cloudy weather forecasted for next five days.
- **Rainfall:** Very light to light rainfall at isolated place forecasted during 10 to 14-September -2025.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-33°C and 24-26°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 90-90% & 70-75, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be S, SW, W and 7-11 km/h, respectively.

(2) MORBI DISTRICT:

	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	13/09/2025	14/09/2025
Rainfall (mm)	4	2	1	1	1
Max.Temp.(°C)	32	32	33	33	33
Min.Temp.(°C)	24	24	24	25	26
RH-I (%)	90	90	90	90	90
RH-II (%)	75	70	70	70	70
Wind Speed (kmph)	15	12	13	12	10
Wind Direction(deg.)	197	207	224	226	245
Total CC (octa)	3	3	3	4	5
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Humid and partly cloudy to generally cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: Very light to light rainfall at isolated place forecasted during 10 to 14-September -2025. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-33°C and 24-26°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 90-90% & 70-75, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be S, SW and 10-15 km/h, respectively.					

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	13/09/2025	14/09/2025
Rainfall (mm)	4	3	1	1	1
Max.Temp.(°C)	30	31	32	32	31
Min.Temp.(°C)	26	27	27	28	28
RH-I (%)	90	90	90	90	90
RH-II (%)	85	70	70	75	70
Wind Speed (kmph)	15	12	13	11	7
Wind Direction(deg.)	207	212	229	238	247
Total CC (octa)	5	3	4	5	5
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Humid and partly cloudy to generally cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: Very light to light rainfall at isolated place forecasted during 10 to 14-September -2025. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-32°C and 26-28°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 90-90% & 70-85, respectively. Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be SW and 7-15 km/h, respectively.					

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	13/09/2025	14/09/2025
--	------------	------------	------------	------------	------------

Rainfall (mm)	4	3	2	1	1
Max.Temp.(°C)	32	32	33	33	33
Min.Temp.(°C)	24	24	24	25	26
RH-I (%)	90	90	90	90	90
RH-II (%)	75	70	70	70	70
Wind Speed (kmph)	12	10	12	11	10
Wind Direction(deg.)	194	225	247	255	272
Total CC (octa)	2	3	5	5	6
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Humid and partly cloudy to generally cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: Very light to light rainfall at isolated place forecasted during 10 to 14-September -2025. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-33°C and 24-26°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 90-90% & 70-75, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be S, SW, W and 10-12 km/h, respectively.					

(5) AMRELI DISTRICT:

	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	13/09/2025	14/09/2025
Rainfall (mm)	5	4	3	2	1
Max.Temp.(°C)	33	32	33	33	33
Min.Temp.(°C)	23	22	23	23	23
RH-I (%)	90	90	85	90	90
RH-II (%)	70	70	70	70	70
Wind Speed (kmph)	9	7	8	8	8
Wind Direction(deg.)	208	223	247	259	281
Total CC (octa)	2	3	5	6	6
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Humid and generally cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: Very light to light rainfall at isolated place forecasted during 10 to 14-September -2025. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-33°C and 22-23°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 85-90% & 70-70, respectively. Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be SW, W and 7-9 km/h, respectively.					

(6) JAMNAGAR DISTRICT:

	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	13/09/2025	14/09/2025
Rainfall (mm)	4	2	1	1	1
Max.Temp.(°C)	31	31	30	31	31
Min.Temp.(°C)	26	27	28	29	29
RH-I (%)	90	85	80	80	80

RH-II (%)	80	75	70	70	70
Wind Speed (kmph)	15	12	11	11	8
Wind Direction(deg.)	199	200	220	221	234
Total CC (octa)	4	3	4	5	5
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Humid and partly cloudy to generally cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: Very light to light rainfall at isolated place forecasted during 10 to 14-September -2025. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-31°C and 26-29°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 80-90% & 70-80, respectively. Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be S, SW and 8-15 km/h, respectively.					

Agro meteorological Advisories:

Weather Warning : Nil • Likely impacts of weather warnings on Agriculture and associated Agromet advisories : NIL •			
General Advisory • Carry out earthing up in cotton under wapsa condition. • Carry out weeding in cotton, groundnut and soybean crops. • To prevent fungal disease infestation spray propiconazol @ 10 ml/10 lit of water in all the crops under clear weather. • Apply supplementary dose of nitrogen fertilizer to cotton and vegetable crops as per recommendation. • Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast humid, Generally cloudy and Light rainfall likely to observe during 14 to 19-September-2025. • Sms : Spray Hexaconazole or Propiconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot & rust infestation in groundnut under clear weather.			
Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory
<i>Kharif</i> groundnut	Pegging, pod formation & development	Leaf spot 	• Carry out weeding in groundnut under wapsa condition. • Spray Hexaconazole or Propiconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot & rust infestation in groundnut under clear weather.

		Heliothis & Prodenia	• DO spray of Beauveria bassiana@ 40 gm/10 litre of water for the control of Heliothis & Prodenia infestation in groundnut crop under clear weather. Put light trap to attract adult of prodenia and kill attracted adult by keeping vessels having Quinalfos 20 ml in 10 litre water below the trap.
Cotton	Squaring & flowering	Thrips, Jassids Pink Bollworm	• Under present weather condition thrips and jassids infestation observed in cotton, at above ETL spray acephate 75 % SP 15 gm + Fipronil 5 SC 15 ml with 1500 ppm neem oil 40 ml /10 litre of water under clear weather. • Under present weather condition pink bollworm infestation observed in cotton. For the monitoring of pink bollworm infestation in cotton crop farmers are advised to put pheromone traps 5-6/ha. If infestation found, pick and bury the infested flowers/bolls in soil for control of pink bollworm infestation in cotton. Also make spray of profenofos 50 EC 20 ml in 10 liters of water. • Carry out earthing up, interculturing and weeding operation at vapsa condition to remove weed and conserve soil moisture. • Farmers are advised to spray 3 % KNO₃ solution at flowering, boll initiation and 50% boll formation to Bt. Cotton crop. • Foliar spraying of multi-micronutrient formulation Grade IV (Fe-Mn-Zn-CuB, 4.0-1.0-6.0-0.5-0.5 %) @ 1% at 60, 75 and 90 DAS in Bt. cotton crop is advised.
Sesame	Capsule formation & development	Leaf Webber Mites	• If infestation of leaf Webber observe above ETL, spray Cartep Hydrochloride 15 gram in 10 litres of water OR Neem Seed Kernel Extract (NSKE) 3% (300g /10 l water) under clear weather. • Carry out weeding under wapsa condition. • Spray Mencozeb 75 % WP for prevention of infestation of Alternaria/fungal leaf spot disease in sesame under clear weather.

		Phytophthora blight	• Mite infestation observed in sesame, so monitor the crop. If population is found above ETL, then spraying of Propargite 57 % @ 1.5-2 ml/litre of water under clear weather. • Spray Ridomil 20 gm /10 litre of water for prevention of infestation of Alternaria/fungal leaf spot and Powdery mildew diseases in sesame. •
Pearl millet	Flowering & milking	-.	• Carry out weeding at vapsa condition.
Green gram	Pod development & Ripening	-.	• Pluck mature pods in time.
Black gram	Pod formation	-.	• Carry out weeding in time.
Cow pea	Pod development & Ripening	-	• Pluck mature pods in time.
Pigeon pea	Growing	BDN-2, GT-100, GJP-1, Vaishali	• Carry out weeding in time.
Castor	Growing	Germination/growth	• Carry out weeding in time. • For the control of semilooper and prodenia in castor spray emamectin benzoate 5 gm/10 litre water.
Ladyfinger	Flowering/fruiting	White flies & Mites	• Under clear weather spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml with withacetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm or imidacloprid 30.5 SC 4 ml/10 lit of water for white flies control in okra. • Constant monitoring of ladyfinger crop against attack of mite is advised. If population is found more, then spraying of Ethion @ 1.5-2 ml/litre of water under clear weather. • After harvesting of mature okra application of urea @ 50 kg/ ha should be done.
Ridge gourd	Flowering/fruiting	White fly	• In all broad leafy vegetables whitefly infestation observed above ETL. Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml with acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm or imidacloprid 30.5 SC 4 ml/10 lit of water for whiteflies control under clear weather.
Bottle gourd			
Sponge guard			
Bitter guard			
Cluster bean		Downy mildew	• If mite population is found more, then under clear weather spraying of Ethion @ 1.5-2

Cucumber			ml/litre of water for the control of Mites in cucurbiteous . • For the control of downy mildew spray mencozeb 40g/pump under clear weather.
Brinjal	Flowering/ fruiting	White fly→ Shoot & Fruit borer	• To minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml with Bifenthrin 10 % EC 10 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm or Trizophos 40 EC 25 ml / 10 lit of water. • In brinjal, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If fruits and shoot borer population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml /10 litre of water under clear weather is advised.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips→  Mites Viral leaf curling	• For control of thrips, spray Profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of severe attack, spray Spinosad or Spinetoram 3 ml per 10 liter of water under clear weather. • If infestation of mite observed in chilli, then spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water under clear weather. • Under weather conditions, rouging of viral infested plants should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Imidacloprid @ 3 ml per 10 litre of water is advised to control the vector.
Lemon	Fruit development	Citrus canker Leaf minor	• Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclie 1.5 gm in 10 liters of water for the control of citryst canker in lemon under clear weather. • Spray Quinalphos 20 ml in 10 liters of water for control of leaf minor under clear weather...
Livestock & poultry	 Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Deworming, Protozoan disease evaluation and its treatments should be done. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed. Ensure regarding vaccination of animals for different diseases in rainy season. Spray phenyl in		

	the animal shed to avoid fly's and mosquitoes. Keep fodder in safe place to avoid spoilage due to rainfall.
Note	Kindly download • MAUSAM App for location specific forecast & warning. • MEGHDOOT App for Agromet advisory. • DAMINI App for lighting warning.

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.